



## 1. VÉRIFIEZ L'ÉTAT DE CONSCIENCE

- Secouez doucement les épaules de la victime et appelez-la : «Est-ce que ça va?»
- Aucune réaction ? La victime est inconsciente.  
Restez près de la victime. Appelez de l'aide.



## 2. APPELEZ DIRECTEMENT LE 112 ( OU DEMANDEZ À QUELQU'UN DE LE FAIRE)

- Plusieurs personnes sont présentes ? Demandez à une personne d'appeler le 112 et envoyez une autre chercher le DEA.
- Instructions pour appeler le 112 : demandez une ambulance et dites qu'il s'agit d'une réanimation. Mettez le téléphone sur haut-parleur pour que le collaborateur du central d'appel puisse vous guider.




## 3. VÉRIFIEZ LA RESPIRATION

- Vérifiez la respiration de la victime.
- Pas de respiration normale et vous êtes seul(e)?  
Allez chercher un DEA s'il y en a un directement disponible



## 4. DÉMARREZ LA RÉANIMATION ET LE BOUCHE-À-BOUCHE

- Placez vos mains au milieu du thorax Appuyez sur le sternum de 5 à 6 cm.
- Faites-le 30 fois à un rythme d'au moins 100 fois par minute (maximum 120 par minute).
- Pour améliorer au maximum la qualité de la réanimation, certains DEA disposent d'un rapport de réanimation actif.
- Soufflez 2 fois
- S'il y a un deuxième secouriste : changez de place toutes les 2 minutes. Veillez à limiter au maximum les interruptions lors de la procédure de réanimation.



## 4. S'IL Y A UN DEA

- Veillez à limiter au maximum l'interruption des compressions thoraciques.
- Allumez le DEA et suivez les instructions.
- Placez les électrodes.
- Suivez les instructions du DEA, jusqu'à ce que les ambulanciers vous disent d'arrêter.



## 6. SERVICE APRÈS UTILISATION

- Nous sommes sur place dans les 6 heures. Pour le DEA et pour vous.
- Nous analysons les données de l'ECG, remplaçons éventuellement la batterie et les électrodes du DEA.
- L'utilisation d'un DEA peut être une expérience éprouvante. AED-Partner vous propose donc un suivi, le cas échéant.
- De plus, AED-Partner participe activement à la bonne mise en service du DEA.